


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Bergamo</p>	<p>ATS DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Policlinico San Marco</p> <p>Gruppo San Donato</p>
--	---	--

**PREPARAZIONE A TC
CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO ENDOVENOSO**

(da compilare a cura del Medico prescrittore, barrando ove necessario. Si prega cortesemente di rispondere a tutte le domande indicate)

Il/La Sig/Sig.ra. ha la necessità di essere sottoposto/a a. per la seguente indicazione.

La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento: **si** **no**

Presenta in anamnesi:

- si** **no**
- Paraproteinemia di Waldenström
 - Insufficienza epatica grave
 - Insufficienza renale moderata/severa
 - Mieloma multiplo
 - Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria
 - Ipertireosi
 - Diabete in trattamento con Metformina
 - È in corso terapia anticoagulante orale

<p>si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Diatesi allergica</p>	<p>IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE</p>
--	--

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame con gli esiti recenti (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame) di

- **CREATININEMIA**
- **GLICEMIA**

Data Firma del medico

N.B. La TC del torace e dell'addome va effettuata dopo almeno 2 giorni dall' esecuzione di altre indagini contrastografiche (studi radiografici dell'apparato digerente, urografie, interventistica, ecc...) e dall' esecuzione di indagini endoscopiche.

PREPARAZIONE ALL' ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO

Abbondante idratazione (almeno 1.5 litri di acqua) il giorno prima dell'esame.

Digiuno per cibi solidi e liquidi da almeno 4 ore prima dell'esame.

Assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio medico di base ad esclusione di

- Metformina che deve essere sospesa nei due giorni precedenti l'esame
- β -bloccanti ed ACE-inibitori che devono essere sospesi il giorno dell'esame (perchè possono aggravare le ipotensioni e rendere inefficace il loro trattamento).

NOTA BENE

- si ricorda che **il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare**, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto i farmaci somministrati durante l'esame possono compromettere la guida nelle ore successive l'indagine
- potrebbe essere prevista, dopo l'esame, una permanenza in struttura per almeno 30 minuti.