


 <p><b>Istituti Clinici Zucchi</b> Gruppo San Donato</p>	<p><b>INFORMAZIONE ALL'ESECUZIONE DI FLUORANGIOGRAFIA RETINICA E ANGIOGRAFIA RETINICA CON INDOCIANINA</b></p>	<p>Mod. <b>AMZSAIN_5202</b> Rev. <b>003 del 28/09/2023</b></p>
<p> <b>Presidio di Monza</b></p>	<p><b>U.O. DI OCULISTICA</b></p>	<p>Responsabile Dott. Fabrizio Formenti</p>

L'esame non necessita di ricovero in quanto viene effettuato ambulatorialmente, previa dilatazione della pupilla.

È consigliabile pertanto venire accompagnati in quanto la midriasi (dilatazione della pupilla) può rendere difficoltosa la guida di autoveicoli.

È possibile eseguire una leggera colazione almeno 3 ore prima (tè+fette biscottate) ed assumere le abituali terapie domiciliari.

Riferire al medico la presenza di allergie a qualsiasi sostanza prima dell'esame. L'iniezione del colorante (fluoresceina o verde indocianina), come anche in caso di assunzione di altri farmaci, potrebbe creare problemi di allergie. A tale motivo viene consegnato un consenso informato da firmare (Mod. SMZSAIC-0001). Effetti collaterale della fluoresceina è la colorazione giallastra della cute e delle urine dopo l'iniezione endovenosa che si protrarrà per qualche ora dopo l'esame.

Il responsabile dell'U.O. di Oculistica  
Dr. F. Formenti